LSK
LANDESVERBAND SACHSEN
DER KLEINGÄRTNER e.V.

Zu Anlage 2 **Verbotene Pflanzen**

Invasive Neophyten

Die invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 - Zweite Fortschreibung 2019 -

Stefan Nehring und Sandra Skowronek

BfN-Skripten 574 - 2020

BfN
Bundesamt für Naturschutz

Quelle: Bundesamt für Naturschutz
https://www.bfn.de/publikationen/bfn-schriften/bfn-schriften-574-die-invasiven-gebietsfremden-arten-der-unionsliste

Überblick zu den invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste ohne wild lebenden Nachweis

Gruppe / Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Ursprüngliches Areal	Lebens-raum [5]	Einführungs-weise
GEFÄSSPFLANZEN = 20				
Acacia saligna [4]	Weidenblatt-Akazie	Australien	T	absichtlich
Alternanthera philoxeroides [2]	Alligatorkraut	Südamerika	S	absichtlich
Andropogon virginicus [4]	Blauständige Besensegge	Nord-/Südamerika	T	absichtlich
Baccharis halimifolia [1]	Kreuzstrauch	Nordamerika	T	absichtlich
Cardiospermum grandiflorum [4]	Ballonwein	Nord-/Südamerika	T	absichtlich
Cortaderia jubata [4]	Rosa Pampasgrasköpfchen	Südamerika	T	absichtlich
Ehrharta calycina [4]	Steppengras	Afrika	T	absichtlich
Gunnera tinctoria [2]	Chilenischer Riesenrhabarber	Südamerika	T	absichtlich
Gymnocoronis spilanthoides [4]	Falscher Wasserfreund	Südamerika	S	absichtlich
Heracleum persicum [1]	Persischer Bärenklau	Temperates Asien	T	absichtlich
Heracleum sosnowskyi [1]	Sosnowskyi Bärenklau	Temperates Asien	T	absichtlich
Lespedeza cuneata [4]	Chinesischer Buschklee	Asien/Australien	T	absichtlich
Lygodium japonicum [4]	Japanischer Kletterfarn	Temperates/Tropisches Asien	T	absichtlich
Microstegium vimineum [2]	Japanisches Stelzengras	Temperates/Tropisches Asien	T	un/absichtlich
Parthenium hysterophorus [1]	Karottenkraut	Nord-/Südamerika	T	absichtlich
Pennisetum setaceum [2]	Afrikanisches Lampenputzergras	Afrika	T	absichtlich
Persicaria perfoliata [1]	Durchwachsener Knöterich	Temperates Asien	T	absichtlich
Prosopis juliflora [4]	Mesquitebaum	Südamerika	T	absichtlich
Pueraria montana var. lobata [1]	Kudzu	Temperates Asien	T	absichtlich
Triadica sebifera [4]	Chinesischer Talgbaum	Temperates Asien	T	absichtlich

Überblick zu den invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste mit wild lebenden Nachweis

Gruppe / Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Ursprüngliches Areal	Lebens-raum [5]	Einführungs-weise
GEFÄSSPFLANZEN = 16				
Ailanthus altissima [4]	Götterbaum	Temperates Asien	T	absichtlich
Asclepias syriaca [2]	Gewöhnliche Seidenpflanze	Nordamerika	T	absichtlich
Cabomba caroliniana [1]	Karolina-Haarnixe	Nord-/Südamerika	S	absichtlich
Eichhornia crassipes [1]	Wasserhyazinthe	Südamerika	S	absichtlich
Elodea nuttallii [2]	Schmalblättrige Wasserpest	Nordamerika	S	absichtlich
Heracleum mantegazzianum [2]	Riesenbärenklau	Temperates Asien	T	absichtlich
Humulus scandens [4]	Japanischer Hopfen	Temperates/Tropisches Asien	T	absichtlich
Hydrocotyle ranunculoides [1]	Großer Wassernabel	Nordamerika	S	absichtlich
Impatiens glandulifera [2]	Drüsiges Springkraut	Temperates/Tropisches Asien	T	absichtlich
Lagarosiphon major [1]	Wechselblatt-Wasserpest	Afrika	S	absichtlich
Ludwigia grandiflora [1]	Großblütiges Heusenkraut	Südamerika	S	absichtlich
Ludwigia peploides [1]	Flutendes Heusenkraut	Nord-/Südamerika	S	absichtlich
Lysichiton americanus [1]	Gelbe Scheincalla	Nordamerika	T	absichtlich
Myriophyllum aquaticum [1]	Brasilianisches Tausendblatt	Südamerika	S	absichtlich
Myriophyllum heterophyllum [2]	Verschiedenblättriges Tausendblatt	Nordamerika	S	absichtlich
Salvinia molesta [4]	Lästiger Schwimmfarn	Südamerika	S	absichtlich

Listung ab [1] *3.8.2016,* [2] *2.8.2017,* [3] *2.2.2019,* [4] *15.8.2019;* [5] T Terrestrisch, S Süßwasser, B Brackwasser, M Meerwasser;

Acacia saligna – Weidenblatt-Akazie

(Synonym: *Acacia cyanophylla*)

Lebensraum: Terrestrisch **Listung:** 15.08.2019

Ursprüngliches Areal: Australien **Unterliegt:** Früherkennung (Art. 16)

Gefahren: Bildet Dominanzbestände mit Veränderung von Vegetationsstrukturen. Reichert Stickstoff im Boden an.

In Deutschland bislang vorhanden:

nicht wild lebend

Ersteinfuhr: 19. Jh.

Handel	Privat	Bot. Garten	Tierpark	Forschung	Zucht
x	x	x			

x vorhanden

wild lebend

Erstnachweis: -

BB	BE	BW	BY	HB	HE	HH	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	AWZ

alpin	atlantisch	kontinental	Nordsee	Ostsee

x aktueller Nachweis; (x) älterer Nachweis

Merkmale: Buschiger Strauch oder Baum mit Wuchshöhen zwischen 2-6 Metern. Zweige oft herunterhängend, gebogen, unbehaart. Immergrün. Blätter doppelt gefiedert, wechselständig angeordnet mit verbreiterten Blattstiel (Phyllodie), herabhängend, 7-25 cm lang und 0,4-2 cm breit, linealisch bis lanzettlich, gebogen oder gerade. Achselständige, gestielte Blütenstände mit fünf- bis zwanzigköpfige Trauben. Winterhart bis -7 °C.

Blütezeit: Goldgelbe Blüten von Februar bis April (im Ursprungsgebiet).

Verwechslungsmöglichkeiten: Anhand von Größe, Form und Farbe der Blattstiele von allen anderen handelsrelevanten australischen Akazien sicher zu unterscheiden.

Beseitigungs-/Kontrollmaßnahmen: Absägen nah am Boden.

Strauch in Blüte (© Georges Jansoone, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143481)

Charakteristischer Blütenstand (© Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3741572)

Quellen: CABI 2018; IUCN 2010